

30 gennaio 2017

## Secondo Incontro

 POLITECNICO DI MILANO



## Le Funzioni

**Incontri con allievi del Liceo Classico**

Luisa Rossi Costa




*Siano  $X$  e  $Y$  insiemi di numeri reali:*

La corrispondenza  $f: X \rightarrow Y$  è **funzione** definita in  $X$  a valori in  $Y$ , quando associa ad ogni  $x$  in  $X$ , uno e un solo  $y$

*$y = f(x)$  definita in  $X \subseteq R$  a valori in  $Y \subseteq R$*

**La funzione è caratterizzata  
dalla legge  $f$  e dal suo insieme  
di definizione  $X$**





*Sia  $f: X \rightarrow Y$  ,  $y = f(x)$*

*Si dice **grafico della funzione** nel piano cartesiano  $(x,y)$  il luogo di punti  $P$  di coordinate*

*$P = (x, f(x))$  con  $x \in X$*

*Si potrebbe utilizzare anche una **rappresentazione cinematica**, su due assi separati,  $x$  dove appare l'insieme di definizione e  $y$  dove invece si rappresentano i valori assunti  $f(x)$  (detti anche immagini), ma è meno espressiva.*




## Luoghi di punti o funzioni?

4

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$x^4 = x^2 - y^2$$



$$y = -5x + 2$$

$$xy = 1$$

$$y = 4x^2 - 1$$



$$x^2 - y^2 = 1$$

$$y = \begin{cases} -x^3 & \text{per } x < -1 \\ 2 & \text{per } -1 \leq x \leq 0 \\ x-1 & \text{per } 0 < x \end{cases} \quad y = 1/n^2 \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$



La funzione  $f: X \rightarrow Y$ , definita nell'insieme  $X$  **simmetrico rispetto all'origine**, è

- **funzione pari** se  $f(x) = f(-x)$ ,  
il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse  $y$ ;
- **funzione dispari** se  $f(x) = -f(-x)$ ;  
il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi





$y=f(x)$  è **monotona crescente** nel suo insieme di definizione  $X$  se, **per ogni coppia** di punti  $x_1 < x_2$


$f(x_1) \leq f(x_2)$  (strettamente se  $f(x_1) < f(x_2)$ )

$y=f(x)$  **monotona decrescente** se  $f(x_1) \geq f(x_2)$

**Attenzione** alla funzione

$$y = 1/x$$

in  $X = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  !!





$$y = mx \quad x \in R$$

$$y = |x| \quad x \in R$$

$$y = x^2 \quad x \in R$$

$$y = x^3 \quad x \in R$$

$$y = -(x+3)^2 \quad x \in R$$

$$y = (x-7)^3 \quad x \in R$$

$$y = [x] \quad \text{parte intera di } x$$

Individuare per ciascuna funzione:

- Insieme di definizione
- Insieme immagine
- Eventuale simmetria
- Monotonia
- .....



$f: X \rightarrow Y$ , è **funzione periodica** definita in  $X$  a valori in  $Y$ , se esiste un  $T$  tale che

$$f(x) = f(x+T) \quad , \text{ per ogni } x \text{ di } X \subseteq \mathbf{R}$$

*Se  $f(x)$  non è definita in un punto  $x^*$  allora non è definita in ogni punto  $x^*+kT$  con  $k$  intero relativo ( $k \in \mathbf{Z}$ )*

Per caratterizzare una **funzione periodica** basta fornire  $f(x)$  in un intervallo di ampiezza uguale al periodo  $T$ , o in un semiperiodo nel caso risulti pari o dispari.



$$y = \sin x$$

$$y = \cos x$$

$$y = \tan x$$

$$y = \cot x$$

Stabilirne l'insieme di definizione e disegnarne il grafico in due periodi

$$y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{in } [0,4] \\ \text{pari} \\ \text{periodo } T = 8 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} -x^2 + 2 & \text{in } (0,3) \\ \text{dispari} \\ \text{periodo } T = 6 \end{cases}$$



Alcune funzioni prima incontrate hanno un *grafico che si disegna senza staccare la matita dal foglio o il gesso dalla lavagna*: si dicono **continue**.

Altre hanno un grafico *composto da archi di linea disgiunti*: presentano **punti di discontinuità**.

Di fatto per parlare di continuità o di discontinuità si deve ricorrere al concetto di **limite**... sopra è solo indicato un **metodo intuitivo** per riconoscere questa caratteristica della funzione.



Augustin L. Cauchy  
1789-1857



## Funzione di Dirichlet

$$y = \begin{cases} 1 & \text{se } x \text{ è razionale} \\ 0 & \text{se } x \text{ è irrazionale} \end{cases} \quad x \in [0,1]$$

## Signum $x$

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}$$

## Funzione di Heaviside (*a gradino*)

$$y = H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



1805-1859





1850-1925



$y=f(x)=x^n$  è funzione definita in  $X=\mathbb{R}$  a valori in  $\mathbb{R}$

$Y=\mathbb{R}$  se  $n$  è dispari;  $Y=\mathbb{R}^+$  se  $n$  è pari

Il grafico contiene sempre i punti  $(0,0)$  e  $(1,1)$






$y=f(x)=x^{1/n}$  è funzione definita in

- $X=\mathbb{R}$  a valori in  $Y=\mathbb{R}$ , se  $n$  dispari
- $X=[0, +\infty)$  a valori in  $Y=[0, +\infty)$ , se  $n$  è pari

Al grafico appartengono sempre i punti  $(0,0)$  e  $(1,1)$





$$y = (x - 5)^2$$

*... parabola  $y=x^2$  traslata in  $x=5$*

$$y = (x + 7)^3$$

*... cubica  $y=x^3$  traslata in  $x=-7$*

$$y = x(x - 5)^2$$

*... stabilisci dove si annulla, il segno, come si comporta attorno agli zeri e per  $x \rightarrow \mp\infty$ ,*

$$y = x^2(x + 7)^3$$

*illustra l'andamento locale e poi raccorda.*

$$y = x^3(x - 2)^2(x + 3)$$

*Le **funzioni polinomiali** sono sempre*

***continue** in  $\mathbb{R}$*





La base dell'esponenziale può essere solo positiva  
 $a > 0$  e *l'esponente  $x$  è un reale qualsiasi ( $x \in \mathbb{R}$ )*

$a = 1$      $y = 1^x = 1$     ...è una retta


$a > 1$     ... è funzione crescente

$0 < a < 1$     ....è funzione decrescente





La funzione logaritmo ha **base**  $a > 0$  con  $a \neq 1$ ;  
l'**argomento**  $x$  può essere **solo positivo** .  
L'**immagine**  $Y$  coincide con  $R$ .



$a > 1$



$0 < a < 1$



John Napier  
1550-1617



**[www.polimi.it](http://www.polimi.it)**

**[www.poliorientami.polimi.it](http://www.poliorientami.polimi.it)**

**[www.mate.polimi.it](http://www.mate.polimi.it)**

**<http://fds.mate.polimi.it>**

**[eventimate@mate.polimi.it](mailto:eventimate@mate.polimi.it)**

**[Luisa.rossi@polimi.it](mailto:Luisa.rossi@polimi.it)**